
Boletim Semanal – semana 10 de 2026

Situação das arboviroses em Recife - PE

Contextualização do município e processamento

O município de Recife (PE) é o mais populoso do estado (1.488.920 habitantes) e possui oficialmente 94 bairros em sua extensão urbana. O uso do espaço urbano de acordo com o uso do solo pode ser observado na figura 1.

O presente boletim apresenta análises realizadas nos níveis municipal e a nível das 6 Regiões Político-Administrativas (RPAs): Norte, Noroeste, Centro, Oeste, Sudoeste e Sul. Estas RPAs são uma divisão oficial do município do Recife, estabelecida para organizar e descentralizar a gestão pública, permitindo um planejamento mais focado nas especificidades de cada área.

Análise da qualidade dos dados notificados

Para a realização das análises foram utilizados os dados do SINAN Online agregados em três níveis: municipal, rpa_nome de saúde e bairro. A agregação dos casos por bairro utilizou a variável “NM_BAIRRO”, pois esta apresentou a maior completude (superior ou igual a 70%) durante o processo de avaliação prévia dos dados (Figura 3). Primeiramente foi realizada padronização dos nomes devido a diferentes grafias ou erros de escrita e remoção das notificações as quais os nomes dos bairros divergiam muito da grafia oficial ou que não constavam da lista dos 94 bairros oficiais. Além disso, para correta agregação dos casos por bairro também foram utilizados os arquivos shapefile dos bairros e RPAs, dados populacionais para bairros e a listagem do nome dos bairros padronizada e correta.




Figure 1: Completude dos dados notificados de Dengue (A) e Chikungunya (B) até a SE10 de acordo com as variáveis de identificação de bairro, nominal (NM_BAIRRO) e numérica (ID_BAIRRO).

A tabela 1 apresenta as informações sobre o número de casos notificados perdidos e o seu percentual em relação ao número de casos totais nas últimas 3 semanas epidemiológicas para dengue e chikungunya. Os casos perdidos correspondem às notificações que não puderam ser alocadas em um determinado bairro devido à falta de preenchimento da variável NM_BAIRRO ou do seu preenchimento com informações muito divergentes à lista de referência (composta por 94 bairros oficiais) e/ou não possuía o preenchimento da variável “ID_BAIRRO”. A figura 4 mostra a informação perdida na série temporal do ano passado e ano atual.

Tabela 1: Número total de casos notificados, casos perdidos e percentual de casos perdidos (não localizáveis geograficamente) nas últimas três semanas epidemiológicas.

SE	Casos notificados	Casos perdidos	% perdidos
dengue			
202610	45	23	33.82
202609	89	30	25.21
202608	190	72	27.48
chikungunya			
202610	10	8	44.44
202609	24	2	7.69
202608	33	2	5.71




Figure 2: Número de dados notificados e perdidos de dengue (A) e chikungunya (B) até a SE10.

Análise da situação das arboviroses

Esse boletim analisa as condições de transmissão das arboviroses utilizando dados de clima (Copernicus ERA5) e de notificação de casos (SINAN) fornecidos semanalmente pela CGARB/SVS/MS. A partir desses dados são analisadas as condições de receptividade climática, transmissão e incidência (ver descrição no final do relatório), tendo como objetivo contribuir para a tomada de decisão na sala de situação. A seguir, são apresentados os resultados das análises em três níveis espaciais: nível do município, RPA.

Situação recente das Arboviroses a nível do município

Esse ano foram notificados até o momento, 1.976 casos das arboviroses monitoradas, o que corresponde a uma incidência acumulada de 119,5 casos por 100.000 habitantes.

Casos notificados, incidência e variação de casos

A tabela abaixo sumariza, em relação às últimas 3 semanas epidemiológicas (SE08, SE09, SE10), o número de casos observados, casos estimados, a incidência por 100 mil habitantes, o total de casos acumulados e o nível de alerta calculados.

Tabela 2: Número de casos observados, casos estimados, incidência, receptividade climática e nível de alerta para as últimas três semanas à nível de município.

SE	Casos acumulados	Casos notificados	Casos estimados	Incidência*	Nível
dengue					
202610	1704	15	232	16	amarelo
202609	1689	87	223	15	amarelo
202608	1602	162	259	17	laranja
chikungunya					
202610	0	2	43	3	amarelo
202609	0	22	48	3	amarelo
202608	0	24	42	3	amarelo

* Casos por 100 mil habitantes

A tabela abaixo categoriza a incidência do município quanto ao limiar epidêmico estabelecido utilizando dados históricos. Valores superiores à 27 casos por 100 mil habitantes indicam o estabelecimento de uma epidemia.

Tabela 3: Limiar epidêmico calculado para o município a partir dos dados históricos.

Limiar	Incidência (casos/100 mil hab.)
Pré-sazonal	6.2
Epidêmico	26.9
Pós-sazonal	8.1

A figura 5 mostra o perfil de incidência de dengue e chikungunya na cidade e as cores indicam o nível de atenção da semana epidemiológica. A descrição dos quatro níveis de atenção do Infodengue e a sua relação com o nível de atenção do Plano de Contingência Nacional estão descritos na tabela em anexo.




Figure 3: Curva de incidência de Dengue (A) e Chikungunya (B) - Recife/PE até SE10. A linha azul representa o número de casos observados e a linha vermelha horizontal o limiar epidêmico (incidência superior a 27 casos por 100 mil habitantes).

Perfil sazonal da receptividade climática

O perfil sazonal da receptividade climática no município para a transmissão das arboviroses é calculado a partir dos dados meteorológicos e indicam períodos do ano em que há maior risco de transmissão de arboviroses. A figura 6 apresenta uma escala de receptividade que varia de 0 (período pouco receptivo) a 100 (período muito receptivo) sendo que, períodos muito receptivos, marcam a sazonalidade da doença. Observa-se que o período receptivo típico no município ocorre entre as semanas 45 e 15, que corresponde ao período com temperaturas mínimas acima de 18 graus.

Receptividade climática e Temperatura Mínima por Semana




Figure 4: Receptividade climática e temperatura mínima do município até SE10. A linha amarela corresponde à variação da temperatura mínima durante o período. A área azul corresponde a período com receptividade climática favorável à transmissão de arboviroses, enquanto a área cinza a receptividade abaixo do limiar favorável.

Comparação da sazonalidade atual com anos anteriores

O perfil sazonal das séries temporais de incidência de casos de dengue e chikungunya nos últimos 10 e 5 anos, respectivamente, estão representadas na figura 7 e podem ser comparadas com a incidência desse ano (marcado em vermelho).





Figure 5: Comparação da incidência do ano atual com do ano passado para Dengue (A) e Chikungunya (B).

Número reprodutivo

O perfil de transmissibilidade da dengue (figura 8) é medido pelo número reprodutivo, R_t . Valores dessa métrica maiores que 1 ou mais de 3 semanas seguidas indicam transmissão sustentada de dengue (figura 8A) ou chikungunya (figura 8B).

a Curva de Rt dengue - Recife até 10



b Curva de Rt chikungunya - Recife até 10




Figure 6: Número reprodutivo semanal de Dengue (a) e Chikungunya (b) para o município estimado até SE10.

Situação das Arboviroses nos Regiões Político-Administrativas (RPAs)

Casos notificados, incidência e variação de casos

Dengue

A tabela abaixo sumariza em relação às últimas 3 semanas epidemiológicas (SE08, SE09, SE10) e para cada RPA, o número de casos observados, casos estimados, a incidência por 100 mil habitantes, o total de casos acumulados e o nível de alerta calculados.

Tabela 4: Número de casos observados, casos estimados, incidência, receptividade climática e nível de alerta para as últimas três semanas, por RPA.

SE	Casos acumulados	Casos notificados	Incidência*	Nível
Centro				
202610	110	5	6.4	amarelo
202609	105	5	6.4	amarelo
202608	100	18	23.0	amarelo
Noroeste				
202610	293	10	3.2	amarelo
202609	283	19	6.0	amarelo
202608	264	38	12.0	amarelo
Norte				
202610	203	17	7.7	amarelo
202609	186	22	9.9	amarelo
202608	164	18	8.1	amarelo
Oeste				
202610	156	3	1.1	amarelo
202609	153	8	2.9	amarelo
202608	145	15	5.4	amarelo
Sudoeste				
202610	231	4	1.5	amarelo
202609	227	11	4.2	amarelo
202608	216	39	14.8	amarelo
Sul				
202610	386	6	1.6	amarelo
202609	380	24	6.3	amarelo
202608	356	62	16.2	amarelo

* Casos por 100 mil habitantes

A figura 9 mostra o perfil de incidência de dengue nos RPAs e as cores indicam o nível de atenção da semana epidemiológica.



Figure 7: Curva de incidência de Dengue por RPAs até SE10. A linha azul representa o número de casos notificados e a linha vermelha horizontal o limiar epidêmico.

A figura 10 ilustra a incidência por 100 mil habitantes dos casos notificados de dengue agregados

por RPA em Recife, entre as semanas epidemiológicas SE08, SE09, SE10 de 2026.




Figure 8: Incidência de Dengue (casos por 100.000 habitantes) por RPAs nas últimas 3 semanas epidemiológicas.

Chikungunya

A tabela abaixo sumariza em relação às últimas 3 semanas epidemiológicas (SE08, SE09, SE10) e para cada RPA, o número de casos observados, casos estimados, a incidência por 100 mil habitantes, o total de casos acumulados e o nível de alerta calculados.

Tabela 5: Número de casos observados, incidência, receptividade climática e nível de alerta para Chikungunya nas últimas três semanas, por RPA.

SE	Casos acumulados	Casos notificados	Incidência*	Nível
Centro				
202610	12	0	0.0	verde
202609	12	1	1.3	amarelo
202608	11	1	1.3	amarelo
Noroeste				
202610	97	5	1.6	amarelo
202609	92	8	2.5	amarelo
202608	84	12	3.8	amarelo
Norte				
202610	14	0	0.0	verde
202609	14	1	0.5	amarelo
202608	13	3	1.4	amarelo
Oeste				
202610	13	0	0.0	verde
202609	13	0	0.0	verde
202608	13	4	1.4	verde
Sudoeste				
202610	39	3	1.1	amarelo
202609	36	6	2.3	verde
202608	30	3	1.1	verde
Sul				
202610	68	2	0.5	amarelo
202609	66	8	2.1	amarelo
202608	58	10	2.6	amarelo

* Casos por 100 mil habitantes

A figura 11 mostra o perfil de incidência de chikungunya nos RPAs e as cores indicam o nível de atenção da semana epidemiológica.



Figure 9: Curva de incidência de Chikungunya por RPAs até SE10.

A figura 12 ilustra a incidência por 100 mil habitantes dos casos notificados de chikungunya agregados por RPA em Recife, entre as semanas epidemiológicas SE08, SE09, SE10 de 2026.




Figure 10: Incidência de Chikungunya (casos por 100.000 habitantes) por RPAs nas últimas 3 semanas epidemiológicas.

Perfil sazonal da transmissão das Arboviroses

O perfil sazonal das arboviroses está representado nos gráficos abaixo. O perfil sazonal da receptividade climática para os RPAs apresenta uma escala que varia de 0 (período pouco receptivo) a 100 (período muito receptivo) sendo que, períodos muito receptivos, marcam a sazonalidade da doença.

O perfil de transmissibilidade para estas arboviroses é medido pelo número reprodutivo (R_t), calculado para cada RPA. Valores dessa métrica maiores que 1 ou mais de 3 semanas seguidas

indicam transmissão sustentada de dengue ou chikungunya.




Figure 11: Número reprodutivo de dengue e chikungunya por RPA semanal estimado até SE10.

Descrição dos indicadores

Casos	Número de casos notificados, por data de primeiro sintoma. Esse dado está sujeito a atualização
Casos esperados	Estimação do número de casos atuais após correção estatística do atraso de notificação
Receptividade	Condições ambientais favoráveis para reprodução e competência do mosquito para transmissão de dengue baseado no clima e na presença de vírus
Transmissão	Indicação de transmissão sustentada de dengue, isso é, sequência de semanas com $R_t > 1$ atualmente ou recentemente
Incidência	Indica o quão alta é a incidência semanal atual em comparação com os valores históricos
Nível	Nível de atenção para a situação da dengue calculado pelo Infodengue. Veja o Quadro de comparação do nível do Infodengue com os níveis do Plano de Contingência Nacional da Dengue do Ministério da Saúde.

Notas

- Os dados de notificação são fornecidos pela Secretaria de Saúde. Esses são dados ainda sujeitos a revisão;
- Em algumas cidades, é aplicado um modelo de nowcasting (correção da incidência atual em função do tempo até a notificação). Esse modelo só é ajustado em cidades com volume de casos suficiente. Quando não há ajuste, a coluna de casos estimados mostra os mesmos valores da coluna de casos;
- A análise de receptividade é feita com base em dados de temperatura e umidade do ar coletadas de aeroportos próximos do município. Em alguns municípios, essa informação pode não ser de boa qualidade;
- Os perfis sazonais de receptividade ambiental e de transmissão são calculados com base na série histórica desde 2010. Foi ajustado um modelo de decisão para identificar as condições climáticas associadas com número reprodutivo maior que 1 na cidade;
- As análises aqui apresentadas são baseadas nos dados disponíveis até a data do relatório. Atualizações dessas informações podem alterar os níveis atribuídos a cada semana. Em cada novo relatório, toda a série histórica é recalculada, por isso, pode haver divergência entre boletins. Nesse caso, considere sempre a última versão.

Créditos

Este é um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e Fiocruz em resultado da parceria de:

- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro;
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas;
- Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde participantes do InfoDengue;

Como citar:

INFODENGUE. Boletim Semanal Municipal de Recife - Semana 10/2026. Brasil, 2026

Anexo

Para facilitar a tomada de decisão, o quadro mostra a relação entre os níveis de atenção do Infodengue e os níveis do Plano de Contingência Nacional para Controle da Dengue

Table 1: Plano de Contingência Nacional para Controle da Dengue

Cor	Nível de Atenção	Situação	Nível de contingência	Situação
Verde	Condições não favoráveis para transmissão / baixo risco	Atividade viral baixa / temperatura ou umidade relativa baixa/ Poucos rumores no Twitter	Nenhuma ação de contingência necessária	-
Amarelo	Atenção: Condições favoráveis com presença de circulação viral	Atividade viral presente (pelo menos 1 caso) / Temperatura ou umidade relativa favoráveis ao vetor/ Presença de rumores no Twitter	Pré-contingência	Condição climática favorece atividade do vetor
Laranja	Transmissão sustentada	Incidência crescente porém dentro dos níveis históricos	Nível 0	Incidência em ascensão por três semanas seguidas + introdução/reintrodução de novo sorotipo ou IP ultrapassar o limite de 1% ou aumento de rumores no Twitter na última semana. Incidência permanecer em ascensão por quatro semanas consecutivas e/ou ocorra notificação de caso grave suspeito ou suspeita de óbito por dengue.
Laranja	Transmissão sustentada	Incidência crescente porém dentro dos níveis históricos	Nível 1	

Table 1: Plano de Contingência Nacional para Controle da Dengue (*continued*)

Cor	Nível de Atenção	Situação	Nível de contingência	Situação
Vermelho	Incidência alta	Incidência alta para os padrões históricos (acima de 90%)	Nível 2	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e/ou ocorra um aglomerado de óbitos suspeitos por dengue.
Vermelho	Incidência alta	Incidência alta para os padrões históricos (acima de 90%)	Nível 3	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e de mortalidade por dengue nas últimas quatro semanas for maior ou igual a 0,06/100 mil habitantes.