

Situação das Arboviroses em Rio de Janeiro - RJ

Esse boletim analisa as condições de transmissão das arboviroses em Rio de Janeiro utilizando dados de clima, redes sociais e notificação de casos fornecido pela Secretaria de Saúde. A partir desses dados são analisadas as condições de receptividade climática, transmissão e incidência (ver [definição](#)), tendo como objetivo contribuir para a tomada de decisão na sala de situação.

Esse ano foram notificados até o momento, 177959 casos de Dengue e Chikungunya, o que corresponde a uma incidência acumulada de 1606,6 casos por 100.000 habitantes. Esse valor corresponde a 934,4 % do registrado no ano passado, no mesmo período.




Figura 1. Contagem semanal de casos notificados de arboviroses no estado. As setas indicam variação semanal.

Curva epidêmica

A figura 2 mostra o padrão de variação da curva epidêmica de chikungunya e dengue, onde saltos positivos seguidos (setas vermelhas) indicam períodos de transmissão.




Figura 2. Curva de casos de chikungunya e dengue indicando variação semanal .

Mapa Estadual

A figura abaixo mostra o mapa da situação atual de transmissão da chikungunya e dengue no estado. As cores indicam os níveis de atenção do Infodengue, confira a relação entre os níveis de atenção e os níveis de contingência no [anexo](#).




Figura 3. Mapa de níveis de atenção

Curvas de notificações por Regionais de Saúde

A figuras 4 e 5 mostram as curvas de notificação de chikungunya e dengue por regional de saúde. Nesses gráficos, pode-se avaliar o perfil temporal desse ano em relação ao ano anterior.




Figura 4. (A) Série de casos de chikungunya por semana por Regional de Saúde; (B) Comparação da incidência acumulada de chikungunya desse ano em relação ao mesmo período do ano passado





Figura 5. (A) Série de casos de dengue por semana por Regional de Saúde; (B) Comparação da incidência acumulada de dengue desse ano em relação ao mesmo período do ano passado

O perfil sazonal das arbovirose para cada regional de Rio de Janeiro está representado nos gráficos abaixo (figura 6) com a semana atual indicada pela seta azul. O perfil sazonal da receptividade climática apresenta uma escala que varia de 0 (período pouco receptivo) a 100 (período muito receptivo) sendo que, períodos muito receptivos, marcam a sazonalidade da doença.



Perfil histórico da transmissão

Os perfis de transmissibilidade de chikungunya e dengue estão representados, respectivamente, na figura 7 e 8. O perfil de transmissibilidade descreve o número reprodutivo médio ao longo do ano e valores maiores que 1 indicam histórico de risco, especialmente se ocorrerem em sequência. O número reprodutivo médio dos casos de dengue foi calculado ao longo dos últimos 10 anos, enquanto chikungunya nos últimos 5 anos.




Figura 7. Perfil histórico da transmissibilidade da chikungunya .

Perfil de transmissibilidade: Dengue




Figura 8. Perfil histórico da transmissibilidade da dengue .

Casos por Regionais de Saúde

As figuras 9 e 10 mostram o número de casos notificados de chikungunya e dengue para cada regional de saúde




Figura 9. Número de casos notificados de chikungunya.




Figura 10. Número de casos notificados de dengue .

Mapas por Regional de Saúde

As figuras abaixo mostram o mapa da situação atual de transmissão da chikungunya e dengue em cada regional.




Figura 11. Mapa de níveis de atenção de chikungunya por regional

Dengue




Figura 12. Mapa de níveis de atenção de dengue por regional

Tabelas: Municípios em nível de atenção

Abaixo está listado os principais municípios em nível de atenção na semana 11 , clique no nome para informações detalhadas para cada município. A descrição e os cenários típicos estão descritos na tabela 5 em [anexo](#).

Tabela 1. Municípios com incidência alta para padrões históricos e **com** tendência de aumento de casos (**transmissão provável**)

Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Chikungunya							
Maricá	RJ	223938	Metropolitana II	7	156	69	média
Dengue							
Volta Redonda	RJ	270543	Médio Paraíba	234	9846	3639	média
Maricá	RJ	223938	Metropolitana II	94	6412	2864	média
Macaé	RJ	262692	Norte	47	3874	1475	média
Campos dos Goytacazes	RJ	474667	Norte	98	2460	518	média
São Gonçalo	RJ	929446	Metropolitana II	5	2230	240	média
São João de Meriti	RJ	393773	Metropolitana I	50	1778	451	média
Duque de Caxias	RJ	782799	Metropolitana I	1	1066	136	média
Rio das Ostras	RJ	149562	Baixada Litorânea	25	752	503	média
Paraty	RJ	50592	Litoral Sul	0	746	1474	média
Barra do Piraí	RJ	91025	Médio Paraíba	58	674	740	média
Piraí	RJ	27996	Médio Paraíba	93	370	1323	média
Casimiro de Abreu	RJ	45570	Baixada Litorânea	0	332	727	média
Teresópolis	RJ	189036	Serrana	8	318	168	média
Macuco	RJ	5446	Serrana	19	312	5729	média
Cachoeiras de Macacu	RJ	53887	Serrana	6	292	542	média
Itaperuna	RJ	99300	Noroeste	40	257	259	média
Carmo	RJ	17149	Serrana	3	222	1295	média
Rio Claro	RJ	18544	Médio Paraíba	10	171	922	média
Cabo Frio	RJ	214057	Baixada Litorânea	5	166	78	média
Mesquita	RJ	168849	Metropolitana I	15	162	96	média
Santo Antônio de Pádua	RJ	40870	Noroeste	4	160	390	média
Valença	RJ	72264	Médio Paraíba	30	156	216	baixa
Rio Bonito	RJ	55068	Metropolitana II	0	150	273	média
Paraíba do Sul	RJ	41786	Centro Sul	11	126	302	média
Carapebus	RJ	13360	Norte	1	122	913	média
Belford Roxo	RJ	446731	Metropolitana I	8	119	27	média
São João da Barra	RJ	36518	Norte	0	112	307	média
Mendes	RJ	17461	Centro Sul	24	95	544	média
Iguaba Grande	RJ	27651	Baixada Litorânea	2	86	309	média

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 2. Municípios com incidência alta para padrões históricos **sem** tendência de aumento de casos (**transmissão improvável**)

	Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Dengue	Rio de Janeiro	RJ	6625849	Metropolitana I	3587	13029	197	média
	Angra dos Reis	RJ	181228	Litoral Sul	28	808	446	média
	Itaboraí	RJ	231004	Metropolitana II	0	406	176	média
	Pinheiral	RJ	24553	Médio Paraíba	60	166	678	média
	Itatiaia	RJ	30766	Médio Paraíba	9	164	531	média
	Três Rios	RJ	76789	Centro Sul	23	144	188	média
	Magé	RJ	248208	Metropolitana I	21	111	45	média
	Italva	RJ	13729	Noroeste	26	104	758	média
	Miracema	RJ	26644	Noroeste	3	71	266	média
	Cantagalo	RJ	19443	Serrana	4	71	365	média
	Vassouras	RJ	38081	Centro Sul	0	57	150	média
	Barra Mansa	RJ	166654	Médio Paraíba	0	53	32	média
	Seropédica	RJ	85359	Metropolitana I	0	47	55	média
	Cordeiro	RJ	20843	Serrana	3	47	225	média
	Areal	RJ	11765	Centro Sul	14	44	374	média
	Sumidouro	RJ	18286	Serrana	1	44	238	média
	Araruama	RJ	126726	Baixada Litorânea	4	40	32	média
	Itaocara	RJ	22989	Noroeste	9	40	174	média
	Engenheiro Paulo de Frontin	RJ	11822	Centro Sul	8	33	279	média
	Aperibé	RJ	10893	Noroeste	5	27	248	média
	Paty do Alferes	RJ	29390	Centro Sul	0	26	88	média
	Mangaratiba	RJ	38953	Litoral Sul	0	16	41	média
	Porto Real	RJ	20375	Médio Paraíba	14	14	69	média
	Bom Jardim	RJ	28166	Serrana	8	8	28	média
	São José do Vale do Rio Preto	RJ	22125	Serrana	0	0	0	baixa

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 3. Municípios com incidência média ou baixa mas **com** tendência de aumento (**transmissão provável**)

	Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Dengue	Petrópolis	RJ	304758	Serrana	0	1064	349	média
	Niterói	RJ	523664	Metropolitana II	0	547	104	média
	Armação dos Búzios	RJ	39033	Baixada Litorânea	0	331	848	média
	Laje do Muriaé	RJ	6767	Noroeste	0	125	1847	média
	Tanguá	RJ	31169	Metropolitana II	1	64	205	média

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Descrição dos indicadores

Esses são os descritores utilizados no Infodengue. Mais detalhes em: <http://info.dengue.mat.br>.

indicadores	descrição
casos	número de casos notificados, por data de primeiro sintoma. Esse dado está sujeito a atualização;
casos esperados	estimação do número de casos atuais após correção estatística do atraso de notificação;
receptividade	indica a presença de condições ambientais favoráveis para reprodução e competência do mosquito para transmissão de dengue baseado no clima e na presença de vírus;
transmissão	indicação de transmissão sustentada de dengue, isso é, sequência de semanas com $R_t > 1$ atualmente ou recentemente;
incidência	indica o quão alta é a incidência semanal atual em comparação com os valores históricos ;
nível	nível de atenção para a situação da dengue calculado pelo Infodengue. Veja o Quadro de comparação do nível do Infodengue com os níveis do Plano de Contingência Nacional da Dengue do Ministério da Saúde.

Notas

- Os dados de notificação são fornecidos pela Secretaria de Saúde. Esses são dados ainda sujeitos a revisão.
- Em algumas cidades, é aplicado um modelo de nowcasting (correção da incidência atual em função do tempo até a notificação). Esse modelo só é ajustado em cidades com volume de casos suficiente. Quando não há ajuste, a coluna de casos estimados mostra os mesmos valores da coluna de casos.
- A análise de receptividade é feita com base em dados de temperatura e umidade do ar coletadas de aeroportos próximos do município. Em alguns municípios, essa informação pode não ser de boa qualidade.
- Os perfis sazonais de receptividade ambiental e de transmissão são calculados com base na série histórica desde 2010. Foi ajustado um modelo de decisão para identificar as condições climáticas associadas com número reprodutivo maior que 1 na cidade.
- As análises aqui apresentadas são baseadas nos dados disponíveis até a data do relatório. Atualizações dessas informações podem alterar os níveis atribuídos a cada semana. Em cada novo relatório, toda a série histórica é recalculada, por isso, pode haver divergência entre boletins. Nesse caso, considere sempre a última versão.

Créditos

Este é um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e Fiocruz em resulta da parceria de:

- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde participantes do InfoDengue.
- Observatório de Dengue da UFMG

[Início](#)

Para mais detalhes sobre o sistema de alerta InfoDengue e os modelos implementados, consultar: <http://info.dengue.mat.br>

Contato: alerta_dengue@fiocruz.br

Anexo

Para facilitar a tomada de decisão, o quadro mostra a relação entre os níveis de atenção do Infodengue e os níveis do Plano de Contingência Nacional para Controle da Dengue.

Cor	Nível de Atenção	Situação	Nível de contingência	Situação
	Condições não favoráveis para transmissão / baixo risco	Atividade viral baixa / Temperatura ou umidade relativa baixa/ Poucos rumores no Twitter	Nenhuma ação de contingência necessária	
	Atenção: Condições favoráveis com presença de circulação viral	Atividade viral presente (pelo menos 1 caso) / Temperatura ou umidade relativa favoráveis ao vetor/ Presença de rumores no Twitter	Pré-contingência	Condição climática favorece atividade do vetor
	Transmissão sustentada	Incidência crescente porém dentro dos níveis históricos	Nível 0	Incidência em ascensão por três semanas seguidas + introdução/reintrodução de novo sorotipo ou IIP ultrapassar o limite de 1% ou aumento de rumores no Twitter na última semana.
			Nível 1	Incidência permanecer em ascensão por quatro semanas consecutivas e/ou ocorra notificação de caso grave suspeito ou suspeita de óbito por dengue.
	Incidência alta	Incidência alta para os padrões históricos (acima de 90%)	Nível 2	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e/ou ocorra um aglomerado de óbitos suspeitos por dengue.
			Nível 3	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e de mortalidade por dengue nas últimas quatro semanas for maior ou igual a 0,06/100 mil habitantes.

Tabela 5. Descrição e cenários típicos para níveis de alerta

Nível	Receptividade	Transmissão	Descrição	Cenários Típicos
Municípios com incidência alta para padrões históricos e tendência de aumento de casos				
	Alta	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de aumento por causa do clima.
	Baixa-média	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de queda por causa do clima
Municípios com incidência alta para padrões históricos, sem tendência de aumento de casos				
	Alta	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico, com potencial recrudescimento; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
	Baixa-média	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
Municípios com incidência média ou baixa mas com tendência de aumento				
	Alta	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima favorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.
	Baixa-média	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima desfavorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.