

Situação das Arboviroses no Brasil

Esse boletim analisa as condições de transmissão da chikungunya e dengue no Brasil utilizando dados de clima e notificação de casos fornecido pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS). A partir desses dados são analisadas as condições de receptividade climática, transmissão e incidência (ver [definição](#)), tendo como objetivo contribuir para a tomada de decisão na sala de situação.

Tabela 1. Casos notificados acumulados

	Casos notificados acumulados (até SE23)	Incidência por 100 mil habitantes dos casos notificados (até SE23)	Valor proporcional ao registrado no ano passado no mesmo período (%)
Chikungunya	93444	45	47,3
Dengue	988465	475,8	31,2
Total	1081909	520,8	32,1

Mapa Incidência

A figura 1 ilustra a incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados de arboviroses (dengue + chikungunya) por municípios, regionais de saúde e macroregiões acumulada entre as semanas epidemiológicas 20 e 23 de 2026.




Figura 1. Mapa Nacional da incidência acumulada por 100 mil habitantes dos casos estimados de arboviroses das semana 20 - 23 de 2026



Figura 2. Incidência de casos suspeitos de Dengue para as Unidades da Federação.



Figura 3. Incidência de casos suspeitos de Chikungunya para as Unidades da Federação.

Alerta de Chikungunya e Dengue no Brasil

As figuras 4 e 5 mostram, respectivamente, o mapa da situação atual de transmissão da chikungunya e da dengue no país por regiões. As cores indicam os níveis de atenção do Infodengue, confira a relação entre os níveis de atenção e os níveis de contingência no [anexo](#).




Figura 4. Mapa Nacional de níveis de atenção de chikungunya da semana 23 de 2026




Figura 5. Mapa Nacional de níveis de atenção de dengue da semana 23 de 2026

Tabelas: Municípios em nível de atenção

As tabelas abaixo listam os principais municípios em nível de atenção na semana 23 , clique no nome para informações detalhadas para cada município. A descrição e os cenários típicos estão descritos na tabela 6 em [anexo](#).

Tabela 2. Municípios com incidência alta para padrões históricos e **com** tendência de aumento de casos (**transmissão provável**)

Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Chikungunya							
Condado	PE	24586	Goiana	17	158	643	média
Jaguaribara	CE	10344	Limoeiro do Norte	18	59	570	baixa
Dengue							
Teresina	PI	868523	Entre Rios	69	686	79	baixa
Sobral	CE	219030	Sobral	108	402	183	baixa
Teixeira de Freitas	BA	147454	Teixeira de Freitas	2	210	142	baixa
Mãe do Rio	PA	34566	Metropolitana III	14	206	596	média
Trindade	GO	149167	Central	23	177	119	baixa
Paraíso do Tocantins	TO	51494	Cantão	56	166	321	baixa
Santo Antônio de Jesus	BA	103055	Santo Antônio de Jesus	16	151	147	baixa
Condado	PE	24586	Goiana	16	148	604	média
Camocim de São Félix	PE	17362	Caruaru	10	94	544	baixa
Guamaré	RN	15312	João Câmara	20	64	418	baixa
Jaguaribara	CE	10344	Limoeiro do Norte	16	47	454	baixa
Dormentes	PE	16159	Petrolina	6	41	254	baixa

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 3. Municípios com incidência alta para padrões históricos **sem** tendência de aumento de casos (**transmissão improvável**)

	Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
	Chikungunya							
	Dourados	MS	261019	Dourados	26	130	50	baixa
	São Paulo	SP	12200180	São Paulo	7	121	1	baixa
	Corumbá	MS	94874	Corumbá	36	98	103	baixa
	Araçatuba	SP	213929	Central do DRS II	5	68	32	baixa
	Angélica	MS	10663	Dourados	12	56	525	baixa
	Gravatá	PE	85983	Caruaru	20	49	57	baixa
	Sidrolândia	MS	51075	Campo Grande	16	45	88	baixa
	Goiana	PE	80983	Goiana	12	43	53	média
	Jardim	MS	26214	Campo Grande	15	38	145	baixa
	Dengue							
	Goiânia	GO	1414483	Central	333	1622	115	baixa
	Rio Verde	GO	214607	Sudoeste I	33	377	176	baixa
	Janaúba	MG	70001	Janaúba/Monte Azul	11	208	298	baixa
	Araguaína	TO	186867	Médio Norte Araguaia	73	172	92	média
	Mossoró	RN	264181	Mossoró	48	164	62	baixa
	Porto Nacional	TO	71101	Amor Perfeito	16	113	159	baixa
	Gravatá	PE	85983	Caruaru	62	107	124	baixa
	Pitangueiras	SP	33731	Horizonte Verde	14	106	316	baixa
	Corumbá	MS	94874	Corumbá	35	92	97	baixa
	Itumbiara	GO	113838	Sul	15	91	80	baixa
	Marataízes	ES	46198	Sul	55	90	195	baixa
	Itapoá	SC	30731	Nordeste	27	89	290	baixa
	Caçapava	SP	96530	Alto Vale do Paraíba	13	76	78	baixa
	Lucas do Rio Verde	MT	83770	Teles Pires	29	68	81	baixa
	Pompéu	MG	30493	Sete Lagoas	11	65	213	média
	Goiana	PE	80983	Goiana	13	60	73	média
	Pereiro	CE	15279	Limoeiro do Norte	12	59	386	baixa
	Várzea Grande	MT	315711	Baixada Cuiabana	32	55	17	baixa
	Castelo	ES	39372	Sul	38	54	137	baixa
	Angélica	MS	10663	Dourados	12	54	506	baixa

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Tabela 4. Municípios com incidência média ou baixa mas **com** tendência de aumento (**transmissão provável**)

	Município	UF	População	Regional	Casos	Casos Estimados	Incidência*	Receptividade
Chikungunya								
	Maceió	AL	960667	1ª Região de Saúde	5	67	7	baixa
	Itambé	PE	34925	Goiana	5	16	46	média
Dengue								
	Guadalupe	PI	10305	Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	3	374	3629	baixa
	São Bento	PB	32252	8ª Região	0	266	825	baixa
	Petrolândia	PE	34302	Arcoverde	0	244	710	baixa
	Itaueira	PI	9939	Vale dos Rios Piauí e Itaueiras	1	181	1821	baixa
	Rio Real	BA	35378	Alagoinhas	0	164	464	média
	Casa Nova	BA	71572	Juazeiro	7	162	227	baixa
	Pio IX	PI	17586	Vale do Rio Guaribas	0	114	648	baixa
	Uruçuí	PI	25166	Tabuleiros do Alto Parnaíba	0	110	439	baixa
	Jundiá	SP	459789	Jundiá	0	102	22	baixa
	Catu	BA	48137	Alagoinhas	0	96	199	média
	Pimenteiras	PI	11172	Vale do Sambito	0	76	680	baixa
	Picos	PI	82028	Vale do Rio Guaribas	4	64	78	baixa
	São Lourenço da Mata	PE	110765	Recife	0	50	45	média
	Presidente Dutra	MA	45102	Presidente Dutra	0	48	106	baixa
	Santana	BA	24778	Santa Maria da Vitória	0	47	190	baixa
	Alto Longá	PI	13185	Entre Rios	0	47	356	baixa
	Mata de São João	BA	48698	Camaçari	9	39	80	baixa
	São Paulo de Olivença	AM	32727	Alto Solimões	0	30	92	média
	João Alfredo	PE	27710	Limoeiro	0	28	101	baixa
	Itambé	PE	34925	Goiana	5	13	37	média

*Incidência por 100 mil habitantes dos casos estimados

Cores: 0-10 10-50 50-100 100-200 200-300 300 ou mais

Descrição dos indicadores

Esses são os descritores utilizados no Infodengue. Mais detalhes em: <http://info.dengue.mat.br>.

indicadores	descrição
casos	número de casos notificados, por data de primeiro sintoma. Esse dado está sujeito a atualização;
casos esperados	estimação do número de casos atuais após correção estatística do atraso de notificação;
receptividade	indica a presença de condições ambientais favoráveis para reprodução e competência do mosquito para transmissão de dengue baseado no clima e na presença de vírus;
transmissão	indicação de transmissão sustentada de dengue, isso é, sequência de semanas com $R_t > 1$ atualmente ou recentemente;
incidência	indica o quão alta é a incidência semanal atual em comparação com os valores históricos ;
nível	nível de atenção para a situação da dengue calculado pelo Infodengue. Veja o Quadro de comparação do nível do Infodengue com os níveis do Plano de Contingência Nacional da Dengue do Ministério da Saúde.

Notas

- Os dados de notificação são fornecidos pela Secretaria de Saúde. Esses são dados ainda sujeitos a revisão.
- Em algumas cidades, é aplicado um modelo de nowcasting (correção da incidência atual em função do tempo até a notificação). Esse modelo só é ajustado em cidades com volume de casos suficiente. Quando não há ajuste, a coluna de casos estimados mostra os mesmos valores da coluna de casos.
- A análise de receptividade é feita com base em dados de temperatura e umidade do ar coletadas de aeroportos próximos do município. Em alguns municípios, essa informação pode não ser de boa qualidade.
- Os perfis sazonais de receptividade ambiental e de transmissão são calculados com base na série histórica desde 2010. Foi ajustado um modelo de decisão para identificar as condições climáticas associadas com número reprodutivo maior que 1 na cidade.
- As análises aqui apresentadas são baseadas nos dados disponíveis até a data do relatório. Atualizações dessas informações podem alterar os níveis atribuídos a cada semana. Em cada novo relatório, toda a série histórica é recalculada, por isso, pode haver divergência entre boletins. Nesse caso, considere sempre a última versão.

Créditos

Este é um projeto desenvolvido com apoio da SVS/MS e Fiocruz em resulta da parceria de:

- Programa de Computação Científica, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro.
- Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getúlio Vargas.
- Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde participantes do InfoDengue.
- Observatório de Dengue da UFMG

[Início](#)

Para mais detalhes sobre o sistema de alerta InfoDengue e os modelos implementados, consultar: <http://info.dengue.mat.br>

Contato: alerta_dengue@fiocruz.br

Anexo

Para facilitar a tomada de decisão, o quadro mostra a relação entre os níveis de atenção do Infodengue e os níveis do Plano de Contingência Nacional para Controle da Dengue.

Cor	Nível de Atenção	Situação	Nível de contingência	Situação
	Condições não favoráveis para transmissão / baixo risco	Atividade viral baixa / Temperatura ou umidade relativa baixa/ Poucos rumores no Twitter	Nenhuma ação de contingência necessária	
	Atenção: Condições favoráveis com presença de circulação viral	Atividade viral presente (pelo menos 1 caso) / Temperatura ou umidade relativa favoráveis ao vetor/ Presença de rumores no Twitter	Pré-contingência	Condição climática favorece atividade do vetor
	Transmissão sustentada	Incidência crescente porém dentro dos níveis históricos	Nível 0	Incidência em ascensão por três semanas seguidas + introdução/reintrodução de novo sorotipo ou IIP ultrapassar o limite de 1% ou aumento de rumores no Twitter na última semana.
			Nível 1	Incidência permanecer em ascensão por quatro semanas consecutivas e/ou ocorra notificação de caso grave suspeito ou suspeita de óbito por dengue.
	Incidência alta	Incidência alta para os padrões históricos (acima de 90%)	Nível 2	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e/ou ocorra um aglomerado de óbitos suspeitos por dengue.
			Nível 3	Número de casos notificados para o ano ultrapassar os do limite máximo com transmissão sustentada de acordo com o diagrama de controle e de mortalidade por dengue nas últimas quatro semanas for maior ou igual a 0,06/100 mil habitantes.

Tabela 6. Descrição e cenários típicos para níveis de alerta

Nível	Receptividade	Transmissão	Descrição	Cenários Típicos
Municípios com incidência alta para padrões históricos e tendência de aumento de casos				
	Alta	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de aumento por causa do clima.
	Baixa-média	Provável	Incidência alta para padrão histórico, com transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	Surto ou epidemia em andamento, com possibilidade de queda por causa do clima
Municípios com incidência alta para padrões históricos, sem tendência de aumento de casos				
	Alta	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima favorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico, com potencial recrudescimento; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
	Baixa-média	Improvável	Incidência alta para padrão histórico, sem indicação de transmissão sustentada; Clima desfavorável para transmissão.	A) Período pós pico epidêmico; B) Aumento abrupto de casos em município com população pequena.
Municípios com incidência média ou baixa mas com tendência de aumento				
	Alta	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima favorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.
	Baixa-média	Provável	Incidência média-baixa, mas com tendência de aumento; Clima desfavorável para transmissão.	Início de surto ou epidemia.